

# ГИНКОВЕГ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Гинковег.

**Международное непатентованное название:** Гинкго Билоба.

**Форма препарата:** мягкие желатиновые капсулы.

**Состав:** каждая мягкая желатиновая капсула содержит:

Гинкго Билоба 80 мг;

Вспомогательные вещества q.s.

Утвержденные красители использованы для оболочек капсул.

Надлежащие излишки добавлены для компенсации потери при хранении.

**Фармакотерапевтическая группа:** ангиопротекторное средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** N06DX02.

**Фармакологическое действие:**

*Фармакодинамика:*

Препарат растительного происхождения, улучшающий мозговое и периферическое кровообращение. Биологически активные вещества экстракта листьев Гинкго Билоба способствуют укреплению и повышению эластичности сосудистой стенки, улучшают реологические свойства крови и вследствие этого улучшается микроциркуляция, снабжение мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой. Препарат улучшает мозговое кровообращение, обладает церебропротекторными свойствами. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект - как на уровне головного мозга, так и на периферии). Препарат нормализует обмен веществ в клетках, препятствует агрегации эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Препятствует повышению фибринолитической активности крови. Препятствует образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Оказывает дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, регулирует кровенаполнение сосудов. Препарат повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга.

*Фармакокинетика:*

Фармакокинетика препарата не изучена.

**Показания к применению:**

- дисциркуляторная энцефалопатия (инсульт, черепно-мозговая травма, престарелый возраст), проявляющаяся следующими симптомами: снижение внимания, ослабление памяти, снижение интеллектуальных способностей, чувство тревоги, головокружение, шум в ушах, нарушения сна;
- нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей), синдром Рейно;
- нейросенсорные нарушения, проявляющиеся головокружением, звоном в ушах, неустойчивой походкой;
- старческая дегенерация желтого пятна;
- диабетическая ретинопатия.

**Противопоказания:**

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, эрозивный гастрит;
- острое нарушение мозгового кровообращения;
- острый инфаркт миокарда;
- беременность, период лактации (в связи с отсутствием достаточного количества клинических данных);
- детский возраст (до 18 лет).

**Способ применения и дозы:**

Препарат принимают перорально, капсулу рекомендуется глотать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды. Препарат принимается во время приема пищи.

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Обычно дозы препарата составляют по 1 капсуле 2 раза в сутки (утром и вечером). Продолжительность курса лечения должна составлять не менее 3 месяцев, улучшение состояния отмечается через 1 месяц терапии.

В случае необходимости, спустя 2-3 месяца после окончания предыдущего курса лечения, проводят повторный курс лечения препаратом Гинковег.

**Побочные действия:**

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), желудочно-кишечные расстройства (диспепсия), снижение свертываемости крови, головная боль, головокружение, бессонница.

В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений прием препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

**Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат Гинковег не рекомендуется применять одновременно с нестероидными противовоспалительными средствами, в связи увеличения риска развития кровотечений.

Препарат Гинковег при сочетанном применении усиливает действие препаратов, обладающих антикоагулянтной активностью.

**Особые указания:**

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Улучшение состояния обычно проявляется через 1 месяц после начала лечения.

При внезапном снижении слуха или потере слуха следует немедленно обратиться за врачебной помощью. Консультация врача также необходима при частом головокружении и шуме в ушах.

Не рекомендуется принимать препарат Гинковег вместе с алкогольными напитками.

**Форма выпуска:**

10 мягких желатиновых капсул в каждом блистере ПВХ. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

Произведено для:

Vegapharm LLP

Лондон, Великобритания Vegapharm

Производитель:

Оушен Хелскеа Пвт. Лтд.

Индия

