

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Бейк.

Международное непатентованное название:

Холина салицилат + Лидокаин + Бензалкония хлорид.

Лекарственная форма: гель для местного применения.

Состав:

Холина салицилата раствор BP

экв. холина салицилату 8,7 % w/w;

Лидокаина гидрохлорид BP 2,0 % w/w;

Бензалкония хлорида раствор BP 0,01 % w/w;

(в качестве консерванта)

В приятной ароматизированной основе q.s.

Фармакотерапевтическая группа:

Прочие препараты для местного применения при заболеваниях полости рта.

Код АТХ: A01AD11.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат, оказывающий местноанестезирующее, антисептическое и противовоспалительное действие.

Холина салицилат оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. Спектр антимикробного действия включает грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, некоторые грибы и вирусы. Действие развивается через 2-3 минуты и длится 2-3 часа.

Лидокаин местный анестетик амидного типа. Обеспечивает местную анестезию, путем блокирования образования и прохождения нервного импульса. Механизм действия связан со стабилизацией проницаемости мембраны нейронов для ионов натрия. Действие лидокаина развивается в течение 1 минуты. Достигнутое снижение чувствительности медленно исчезает в течение 30-60 мин. При местном применении на слизистых оболочках лидокаин всасывается умеренно.

Бензалкония хлорид антисептическое средство, оказывает также противогрибковое, антипротозойное действие, инактивирует вирус герпеса. Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, грамотрицательных бактерий (кишечной и синегнойной палочек, протей, клебсиеллы и др.), анаэробных бактерий, грибов и плесени. Действует на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Не влияет на нормальную микрофлору. Практически не всасывается при местном применении.

Оптимальное противомикробное действие и адекватное обезболивание развиваются через 5-10 минут после применения препарата Бейк.

Фармакокинетика:

При нанесении на слизистые оболочки хорошо всасывается.

Показания к применению:

Бейк гель обладает заживляющим эффектом и применяется как местное болеутоляющее, антисептическое и противовоспалительное средство при следующих состояниях:

- зубная боль;
- повреждение слизистой оболочки полости рта (мозоли, язвы, ранки, ожоги);
- инфекционно-воспалительные, язвенно-некротические и трофические заболевания слизистой оболочки полости рта;
- заболевания пародонта;
- хейлиты;
- послеоперационный период, после небольших оперативных вмешательств в полость рта.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- детский возраст (до 12 лет), в связи с отсутствием данных по безопасности применения препарата в эти периоды;
- беременность и период лактации.

Способ применения и дозы:

Местно, небольшое количество геля (около 10 мм) наносят на кончик чистого указательного пальца и осторожно, легкими массирующими движениями, втирают в воспаленную область 3-4 раза в день или иначе по рекомендации стоматолога.

При лечении болезней пародонта вводят в десневые карманы или осторожно втирают в воспаленные десны 1-2 раза в сутки, а также в виде аппликации или пародонтологической повязки.

Побочные действия:

Редко - аллергические реакции.

Чувство жжения в месте аппликации проходящее самостоятельно.

Передозировка:

Случаев передозировки при местном стоматологическом применении неизвестно.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Избегать совместного применения с препаратами йода.

Ингибиторы моноаминоксидазы (MAO) усиливают местноанестезирующее действие лидокаина.

Препарат несовместим с мылом, а также детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрий карбоксиметилцеллюлозу). Препарат усиливает действие противовоспалительных, жаропонижающих и анальгезирующих лекарственных средств для местного и системного применения.

Особые указания:

Только для стоматологического местного использования.

Отсутствие сахара в составе обеспечивает возможность применения препарата у больных сахарным диабетом.

Не использовать препарат при наличии аллергических реакций к препаратам из группы нестероидных противовоспалительных средств, местным анестетикам (лидокаин) или бензалкония хлориду.

При отсутствии эффекта от использования препарата или при ухудшении, следует немедленно обратиться к врачу.

При случайном употреблении внутрь геля необходимо обратиться за медицинской помощью.

Форма выпуска:

Гель для местного применения в ламинированной тубе 15 г. Одна туба вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

Vegapharm LLP

Лондон, Великобритания

Производитель:

Нанз Мед Сайнс Фарма (П) Лтд

Индия



Vegapharm