

# РОЛИФИН

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Ролифин.

**Международное непатентованное название:** фенилэфрин.

**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные.

**Состав:** каждый суппозиторий содержит:

Фенилэфрина гидрохлорид USP 5 мг;

Вспомогательные вещества q.s.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство лечения геморроя.

**Код ATХ:** C05AX03.

**Фармакологическое действие:**

Фенилэфрина гидрохлорид является а-адреномиметиком, оказывает местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению экссудации, отечности тканей, зуда при геморрое.

**Показания к применению:**

Внешний и внутренний геморрой, трещины заднего прохода, эрозия и микротравмы заднего прохода, анальный зуд.

**Противопоказания:**

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; тромбоэмболическая болезнь; гранулоцитопения; детский возраст до 12 лет.

**С осторожностью:** артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, задержка мочи (гипертрофия предстательной железы), беременность, период лактации.

**Способ применения и дозы:**

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Ректально по 1 суппозиторию утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника до 4 раз в сутки.

**Побочное действие:**

Редко - аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Из-за содержащегося фенилэфрина снижает действие гипотензивных лекарственных средств. При одновременном назначении с антидепрессантами - ингибиторами МАО возможно развитие гипертонического криза.

**Особые указания:**

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом.

В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО.

**Форма выпуска:**

Суппозитории ректальные. 6 суппозиториев в блистере ПВХ/ПЭ.

2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

Произведено для:

Vegapharm LLP

Лондон, Великобритания Vegapharm

Производитель:

Блис ДжиВиЭс Фарма Лтд.,

Индия

