



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Тоедин Гино.

Международное непатентованное название:

Повидон-Иод.

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные.

Состав: каждый суппозиторий содержит:

Повидон-Иод ВР 200 мг.

(содержание йода 20 мг)

Вспомогательные вещества q.s.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: G01AX11.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Антисептический и дезинфицирующий препарат. Оказывает бактерицидное действие, связанное с выделением свободного йода путем равновесной реакции. Комплекс повидон-йод представляет собой депо йода, постоянно высвобождающего элементарный йод и обеспечивающего постоянную концентрацию активного свободного йода. Свободный йод реагирует с окисляемыми группами SH- или OH- аминокислотных звеньев ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя и уничтожая эти ферменты и белки. *In vitro* большинство микроорганизмов погибает в течение меньше чем одной минуты, при этом наибольший бактерицидный эффект наблюдается в течение 15-30 секунд. При этом йод обесцвечивается, поэтому интенсивность коричневого окрашивания служит индикатором эффективности препарата. Этот относительно неспецифичный механизм действия объясняет широкий спектр действия повидон-йода на грамположительные и грамотрицательные бактерии, *Gardenerella vaginalis*, *Treponema pallidum*, хламидии, микоплазмы, простейшие (в т.ч. трихомонады), вирусы (в т.ч. вирус герпеса и ВИЧ), грибы (например, рода *Candida*) и споры. Благодаря такому механизму действия, развития резистентности к препарату (в т.ч. вторичной резистентности) при длительном применении не ожидается.

Препарат способствует быстрому восстановлению нормальной флоры влагалища, при этом исчезают такие симптомы, как ощущение жжения и зуд. Суппозитории изготовлены на водорастворимой основе и не оказывают раздражающего действия.

Фармакокинетика:

При вагинальном применении судьба всосавшегося йода или йодида в организме в основном аналогична судьбе йода, вводимого любым другим способом. Йод быстро всасывается, а содержание общего йода и свободного йода в плазме значительно повышается. Выделяется преимущественно через почки. Биологический период полувыведения после вагинального применения составляет примерно 2 дня.

Показания к применению:

- лечение вагинитов (смешанные, неспецифические);
- кандидоз;
- трихомониаз (*Trichomonas vaginalis*) (при необходимости следует проводить комбинированное системное лечение);
- генитальный герпес;
- предоперационная и послеоперационная обработка (с целью профилактики) до и после хирургических операций на влагалище, а также акушерских и диагностических процедур.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к составу препарата;
- аденома щитовидной железы;
- гипертиреоз;
- герпетический дерматит Дюринга;
- ХПН;

- одновременное использование радиоактивного йода;

- беременность и период лактации;

- детский и подростковый возраст.

Способ применения и дозы:

Интравагинально (глубоко).

После предварительной гигиенической обработки, суппозитории вагинальные рекомендуются вводить глубоко во влагалище.

При остром вагините 1-2 раза в сутки в течение 7 дней, *при хроническом и подостром вагините* — 1 раз в сутки перед сном в течение 14 дней (возможно дольше).

Терапию суппозиториями Тоедин Гино не прерывают во время менструации.

Побочные действия:

В отдельных случаях при гиперчувствительности к препарату возможно местное проявление аллергических реакций на йод (гиперемия, жжение, зуд, отек, боль), требующих отмены препарата. Длительное применение (более 7-10 дней) может вызвать явление йодизма («металлический» привкус во рту, повышенное слюноотечение, отеки глаз или гортани и т.д.), при появлении симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Симптомы: анурия, недостаточность кровообращения, отек гортани с вторичной асфиксией, отек легких, нарушения обмена веществ.

Лечение: токсические концентрации йода в сыворотке крови можно эффективно снизить перитонеальным диализом или гемодиализом. Кроме того, тщательное клиническое наблюдение за функцией щитовидной железы должно быть установлено для исключения или раннего выявления связанного йодом гипертиреоза.

Лекарственные взаимодействия:

Несовместим с другими дезинфицирующими и антисептическими средствами, особенно содержащими щелочи, ферменты и ртуть. Активность снижается в кислой среде.

Особые указания:

При нарушении функции щитовидной железы препарат можно применять только под контролем врача.

Окраска на коже и глазах легко смывается водой. После контакта с препаратом следует избегать его попадания в глаза.

Перед началом терапии вагинальными суппозиториями Тоедин Гино, рекомендуется исключить беременность у женщин репродуктивного возраста.

Во время применения препарата рекомендуется использование гигиенических прокладок.

Следует не допускать случайного попадания препарата в рот или ЖКТ, особенно у детей.

Форма выпуска:

7 вагинальных суппозиторияев в каждом блистере ПВХ. 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
Vegapharm LLP
Лондон, Великобритания
Производитель:
Блис ДжинВиЭс Фарма Лимитед
Индия