

АДЕНЕРОН

Инструкция по применению

Торговое название: Аденерон.

Форма изделия: суппозитории для ректального применения.

Состав: каждый суппозиторий содержит: экстракт цветочной пыльцы (7% паста) 24,7 мг, гиалуронат натрия 3,3 мг, жирорастворимый экстракт мальвы обыкновенной, жирорастворимый экстракт календулы лекарственной, жирорастворимый экстракт алоэ барбаденсис, эфирное масло листьев эвгении карофиллус, витамин Е ацетат, витамин А пальмитат, полусинтетические глицериды, С10-18 глицериды/С 12-18 глицериды, коллоидный кремний.

Хронический простатит, как бактериальный, так и абактериальный, является многофакторным заболеванием, который может проявляться как следствие предшествующего простатита или вызван бактериальными микроорганизмами, травмами, психофизическими факторами, нарушением половой жизни, неправильным образом жизни. Хронический простатит может быть следствием проктологических заболеваний (свищей, трещин, геморроя), так и сам быть их причиной. Часто сопровождается болевым синдромом в паху, промежности, с последующим давлением и воспалением половых нервов. От этого состояния устанавливается высокое давление на ампулу прямой кишки, что способствует прохождению бактерий из ректальной ампулы в предстательную железу по кровеносным и лимфатическим сосудам малого таза. Уменьшение прохождения патогенных бактерий из прямой кишки в предстательную железу представляет собой первый шаг к восстановлению нормального физиологического состояния простаты.

Свойства продукта:

Аденерон представляет собой медицинское изделие, содержащее экстракт цветочной пыльцы, гиалуроновую кислоту, жирорастворимые экстракты мальвы, календулы и алоэ.

Препарат Аденерон имеет двойное действие:

- способствует образованию пленки на слизистых оболочках прямой кишки, формирует барьер и препятствует проникновению патогенных микроорганизмов;
- благодаря своему смягчающему и успокаивающему действию, способствует восстановлению физиологического состояния слизистой оболочки прямой кишки.

Показания к применению:

Аденерон в качестве дополнительного средства при лечении местных симптомов (жжение, боль), которые могут возникать в аноректальной области в результате застойных явлений, связанных с острым и хроническим простатитом.

Способ применения и дозы:

Ректально. Открыть суппозиторий, потянув за два края блистера. Соблюдать правила гигиены: мыть руки до и после использования суппозитория Аденерон.

Применять по 1 суппозиторию в день, предпочтительно вечером перед сном, в течение не менее 10 дней подряд или по рекомендации врача. Продолжительность использования зависит от развития симптомов.

Противопоказания:

Гиперчувствительность к составу продукта.

Взаимодействия с другими средствами:

Взаимодействия с другими средствами не исследовались, в связи с этим перед применением суппозитория Аденерон вместе с другими средствами для ректального использования проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания:

При длительном применении средства, предназначенного для местного использования, могут развиваться симптомы гиперчувствительности, в этом случае необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Избегать контакта с глазами.

Не глотать.

Не использовать, если повреждена упаковка.

Влияние на способность управлять автомобилем, использовать оборудование или машины:

Особые меры предосторожности не предусмотрены.

Форма выпуска:

5 ректальных суппозитория в блистерной упаковке.

2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.