

ИНОМАСТИН

Инструкция по применению

Торговое название: Иномастин.

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: капсулы.

Состав: каждая капсула содержит:

Мио-инозитол	200 мг
Бетаин	175 мг
N-ацетилцистеин	100 мг
Экстракт босвеллии пильчатой	50 мг
Витамин B2 (рибофлавин)	2,1 мг
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид)	2,1 мг
Фолиевая кислота	300 мкг
Витамин B12 (цианокобаламин)	3,75 мкг

Вспомогательные вещества: наполнители - кальция фосфат (E341) и микрокристаллическая целлюлоза (E460), антикомкователи - стеарат магния (E470) и кремния диоксид (E551), капсула (желатин, титана диоксид, железа оксид).

Фармакологическое действие:

Иномастин – способствует поддержанию здоровья молочной железы и баланса женских половых гормонов, снижению риска развития заболеваний молочной железы.

Мио-инозитол является витаминным фактором группы В. В теле человека вещество находится в виде фосфолипидов и стимулирует выработку эндогенного лецитина. Мио-инозитол участвует в нормализации менструального цикла и овуляции, в функционировании репродуктивной системы организма, улучшает общий метаболизм органов и систем.

N-ацетилцистеин оказывает выраженное антиоксидантное действие.

Трава босвеллии обладает противовоспалительным свойством, уменьшает боли в груди, устраняет симптомы масталгии.

Витамин B6 регулирует гормональный фон и успокаивает чувствительную грудь.

Бетаин, Витамины B6 и B12 в сочетании с фолиевой кислотой способствуют поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови.

Показания к применению:

При комплексном лечении фиброзно-кистозной мастопатии, масталгии и увеличении плотности молочных желез.

Способ применения и дозы:

Внутрь. По одной капсуле в день.

Продолжительность приёма 1 месяц. При необходимости можно повторить.

Суточная доза и продолжительность приема препарата Иномастин определяется врачом индивидуально и может отличаться от рекомендуемой дозы в инструкции.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Превышение рекомендуемой дозировки витаминов может привести к развитию гипervитаминоза. Для всех витаминов группы В типичными симптомами интоксикации являются: повышение двигательной активности; речевое возбуждение; нарушение сна – бессонница; гиперемия – переполнение сосудов кровью; повышенная чувствительность кожи; головокружение; головные боли разной степени интенсивности; судороги; приступы тахикардии и усиленного биения сердца.

Противопоказания:

- ✗ гиперчувствительность к компонентам препарата;
- ✗ злокачественные заболевания молочной железы;
- ✗ беременность и период лактации;
- ✗ детский возраст.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

Нет данных.

Особые указания:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Применять по рекомендации и под наблюдением врача-маммолога.

Препарат не влияет на способность к управлению автотранспортом и работу с механизмами.

Форма выпуска:

10 капсул в каждом блистере. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

24 месяца. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

Vegapharm LLP

Лондон, Великобритания

Производитель:

Fortex Nutraceuticals Ltd.,

Болгария

