

ЛАКТАВЕЛ

Инструкция по применению

Торговое название: Лактавел.

Лекарственная форма: капсулы для приема внутрь.

Состав: каждая капсула содержит:

активное вещество:

Лактаза 700 МЕ.

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, дикальцийфосфат, стеарат магния, диоксид кремния, желатин, диоксид титана, оксид железа.

Фармакологическое действие:

Лактавел ферментный препарат, дополнительный источник фермента лактазы с целью улучшения усвоения молочных продуктов.

Лактоза необходима для становления здоровой микрофлоры кишечника, участвующей в синтезе витаминов группы В; способствует усвоению кальция и магния, которые требуются для своевременного прорезывания зубов и роста костей; является источником энергии, обеспечивает нормальное развитие нервной системы и зрительного аппарата растущего ребенка.

Прием препарата Лактавел быстро купирует симптомы дефицита лактазы, улучшая качество пищеварения.

Недостаток собственного фермента наиболее часто встречается у детей первого года жизни с младенческими коликами, у большинства недоношенных и маловесных детей, также у детей во время или после кишечных расстройств и при врожденной лактазной недостаточности. В раннем детстве прием препарата Лактавел помогает малышам эффективнее переваривать грудное молоко, уменьшая вздутие живота, ликвидировав детские колики.

Лактавел действует только на углевод молока, которым кормят малыша, не мешая развиваться ферментной и пищеварительной системам.

Показания к применению:

Лактавел может применяться для восполнения дефицита лактазы у детей с первых дней жизни при младенческих коликах, после кишечных инфекций и диареи, при воспалительных заболеваниях пищеварительной системы.

Применение Лактавел может быть рекомендовано во время или после кишечных расстройств (диареи), инфекционных заболеваний кишечника и врожденной лактазной недостаточности.

Способ применения и дозы:

Лактавел применяется из расчета 1 капсула на 100 мл молока или молочной смеси. Давать ребенку в каждое молочное кормление.

Детям до 1 года содержимое 1 капсулы на одно кормление (при грудном вскармливании перед началом каждого кормления в 30 мл сцеженного грудного молока добавляют содержимое капсулы, при

искусственном вскармливании содержимое капсулы добавляют в порцию молочного питания).

Детям от 1 года до 5 лет содержимое 1-5 капсул (в зависимости от количества молока) добавлять в негорячую (до +37°C) пищу, содержащую молоко, тщательно перемешать, через несколько минут приступить к приему пищи.

Детям от 5 до 7 лет содержимое от 2 до 7 капсул (в зависимости от количества молока) с негорячей пищей, содержащей молоко, тщательно перемешать, через несколько минут приступить к приему пищи.

Побочные действия:

При применении по схеме, указанной в инструкции, не отмечено.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе) фермента лактазы или других компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

О лекарственном взаимодействии препарата Лактавел с другими препаратами данных нет.

Особые указания:

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. При назначении препарата Лактавел, его необходимо давать ребенку при каждом кормлении (грудным молоком/молочной смесью).

Для приема внутрь предназначено только содержимое капсулы. Категорически запрещается давать ребенку содержимое капсулы без разведения в молоке, ввиду наличия риска асфиксии сухим порошком.

Форма выпуска:

10 капсул в каждом блистере ПВХ или алюминиевом блистере. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

Произведено для:

Vegapharm LLP

Лондон, Великобритания  Vegapharm

Производитель:

Fortex Nutraceuticals Ltd.,

10, Prohladen kat str, Suhodol distr.,

София 1362, Болгария